

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

### DURATEARS Oogzalf

#### **Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.**

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt DURATEARS gebruikt?
2. Wanneer mag u DURATEARS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u DURATEARS?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u DURATEARS?
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAARVOOR WORDT DURATEARS GEBRUIKT?**

DURATEARS is een oogzalf die droge ogen verzacht.

DURATEARS wordt gebruikt:

- als smeermiddel voor het oog
  - na verwijdering van een vreemd voorwerp uit het oog
  - na een heelkundige ingreep in het oog
  - bij patiënten onder algemene verdoving
- bij droge ontsteking van het hoornvlies, als smeermiddel gedurende de nacht.

#### **2. WANNEER MAG U DURATEARS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

##### **Wanneer mag u DURATEARS niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met DURATEARS?**

- Gebruik DURATEARS **uitsluitend** in uw oog (ogen).
- Als u oogpijn, veranderingen in uw gezichtsvermogen, irritatie van uw ogen of blijvende roodheid ondervindt, of als uw aandoening verergert of niet verbetert na 3 dagen, stop dan de behandeling en contacteer uw arts.
- Draag geen **contactlenzen** tijdens de behandeling met DURATEARS oogzalf.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke toediening. Breng uw oogzalf als laatste aan.

Gebruikt u naast DURATEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

U mag DURATEARS gebruiken wanneer U zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Als u na het gebruik van DURATEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.

## **3 . HOE GEBRUIKT U DURATEARS?**

Gebruik DURATEARS altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, tenzij uw arts u iets anders gezegd heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Contacteer uw arts als uw symptomen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen.


Als uw arts u DURATEARS heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u DURATEARS moet gebruiken. **Stop de behandeling niet voortijdig.**

### **De gebruikelijke dosering:**

- een kleine hoeveelheid zalf in het aangedane oog (de aangedane ogen) 's avonds, voordat u gaat slapen

Gebruik DURATEARS **uitsluitend** in uw ogen (ogen).

### **Wijze van gebruik:**



1

2

3

1. **Was uw handen** voordat u DURATEARS gebruikt.
2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.

3. Draai de dop van de tube.
4. **Zorg ervoor dat de punt van de tube niets anders aanraakt**, anders kan de inhoud ervan verontreinigd geraken.
5. Houd uw hoofd achterover.
6. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger totdat er zich tussen het ooglid en het oog een “zakje” vormt (Afbeelding 1). Het sliertje zalf moet hierin komen.
7. Breng de punt van de tube dicht tegen uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als dit helpt.
8. Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met de punt van de tube.
9. Knijp voorzichtig op de tube om een sliertje zalf naar buiten te duwen in het “zakje” (Afbeelding 2).
10. **Sluit uw oog gedurende enkele seconden** na het aanbrengen van de zalf (Afbeelding 3).
11. Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 10 voor het andere oog. Schroef de dop weer stevig op de tube.

#### **Heeft u te veel van DURATEARS gebruikt?**

- DURATEARS mag zo vaak als nodig gebruikt worden, tenzij uw arts u iets anders gezegd heeft.
- Als u meer van DURATEARS **in uw oog** heeft aangebracht dan nodig, spoel het er dan uit met lauw water. Breng geen zalf meer aan tot het tijd is voor uw volgende dosis.
- Wanneer u per ongeluk de inhoud van een volledige tube DURATEARS heeft **ingeslikt**, zou er zich geen enkele bijwerking mogen voordoen. Het is echter aangeraden om het advies te vragen van uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (**070/245.245**).

#### **Bent u vergeten DURATEARS te gebruiken?**

Als u bent vergeten uw zalf te gebruiken, gebruik ze dan zodra u er aan denkt. Breng geen extra zalf aan in uw oog om de gemiste dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het gebruik van DURATEARS**

Wanneer u de behandeling stopt, kunnen de symptomen van droge ogen terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan DURATEARS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kunt één of meerdere van de volgende effecten in uw ogen ondervinden:

- oogongemak
- oogirritatie
- zwelling van de ogen
- oogpijn
- roodheid van het oog
- verhoogde traanproductie

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **5. HOE BEWAART U DURATEARS?**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

**Gebruik DURATEARS niet langer dan 4 weken na eerste opening.**

Gebruik DURATEARS niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en het doosje na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

## 6. AANVULLENDE INFORMATIE

### **Welke stoffen zitten er in DURATEARS?**

- Dit geneesmiddel bevat geen werkzame stoffen.
- De andere stoffen zijn watervrije vloeibare lanoline, vloeibare paraffine en witte zachte paraffine.

### **Hoe ziet DURATEARS eruit en hoeveel zit er in de verpakking?**

DURATEARS oogzalf is een witte tot lichtgele, doorzichtige, homogene zalf, geleverd in een aluminium tube van 3,5 g met een schroefdop.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

ALCON NV  
Medialaan 36  
B-1800 Vilvoorde

#### **Fabrikant**

SA ALCON-COUVREUR NV  
Rijksweg 14  
B-2870 Puurs

#### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE 160377

**Wijze van aflevering:** Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is herzien in december 2012.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2013.