

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA NV Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Ultra-K 4680 mg/15 ml drank
Roundup var._IB_C.I.z._readability test ID124706	Pagina 1 van 4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

ULTRA-K 4680 mg/15 ml drank

Kaliumgluconaat

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Ultra-K 4680 mg/15ml drank gebruikt
2. Wanneer mag u Ultra-K 4680 mg/15ml drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn
3. Hoe gebruikt u Ultra-K 4680 mg/15ml drank
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ultra-K 4680 mg/15ml drank
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT ULTRA-K 4680 MG/15ML DRANK GEBRUIKT

Het geneesmiddel behoort bij de groep der kaliumzouten.

Het is aangewezen voor het herstellen van kaliumtekort dat voorkomt bij:

- een slechte (niet aangepaste) voeding;
- chronische diarree;
- kaliumverlies door een nierziekte (nierinsufficiëntie).

Opmerking:

De patiënten die het meest gevoelig zijn voor kaliumtekort zijn diegenen die tezelfdertijd een behandeling met digitalis (geneesmiddel voor het hart) moeten volgen en producten moeten nemen ter bevordering van de urineproductie.

2. WANNEER MAG U ULTRA-K 4680 MG/15ML DRANK NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN

Wanneer mag u Ultra-K niet gebruiken

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Bij ernstige nierziekten.
- Bij ziekte van de bijnieren (ziekte van Addison).
- Bij inname van bepaalde geneesmiddelen ter bevordering van de urineproductie die het kaliumgehalte in het bloed verhogen (kaliumsparende diuretica).

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA NV Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Ultra-K 4680 mg/15 ml drank
Roundup var._IB_C.l.z._readability test ID124706	Pagina 2 van 4

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ultra-K

- Bij een oudere patiënt, die lijdt aan een ernstige nierziekte, mag Ultra-K slechts toegediend worden onder toezicht van een geneesheer.
- Bloedonderzoeken moeten uitgevoerd worden om te vermijden dat het kaliumgehalte in het bloed abnormaal stijgt.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Ultra-K nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Ultra-K en geneesmiddelen ter bevordering van de urineproductie die het kaliumgehalte in het bloed verhogen (kaliumsparende diuretica), mogen niet tegelijkertijd toegediend worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Ultra-K zal slechts gebruikt worden in geval van noodzaak.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Ultra-K waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoesaat (E218). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en uitzonderlijk benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Dit geneesmiddel bevat de kleurstof Cochenille rood (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

3. HOE GEBRUIKT U ULTRA-K 4680 MG/15ML DRANK

Gebruik Ultra-K altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Meng de inhoud van een soeplepel in een glas water of fruitsap; in te nemen tijdens de maaltijd.
- De gebruikelijke dosering is 3 tot 4 soeplepels per dag tot het kaliumverlies is hersteld.

Gebruik bij kinderen

Gebruik dit geneesmiddel bij kinderen en zuigelingen enkel onder toezicht van een arts.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA NV Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Ultra-K 4680 mg/15 ml drank
Roundup var._IB_C.l.z._readability test ID124706	Pagina 3 van 4

Heeft u te veel van Ultra-K gebruikt

Wanneer u te veel van Ultra-K heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum **(070/245.245)**.

Bij een matige verhoging van het kaliumgehalte in het bloed, moet de behandeling met Ultra-K onmiddellijk gestopt worden.

Bij een sterke verhoging moet de patiënt gehospitaliseerd worden.

Bent u vergeten Ultra-K te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik Ultra-K

Kaliumtekort zal heroptreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Ultra-K bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Spijsverteringsstoornissen: misselijkheid, maagkrampen en overgeven.
- Abnormale verhoging van het kaliumgehalte in het bloed (voornamelijk bij nierziekten), die een gevoel van verwarring, lage bloeddruk en stoornissen in het hartritme veroorzaakt.
- Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoesaat (E218). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en uitzonderlijk benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).
Dit geneesmiddel bevat de kleurstof Cochenille rood (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ULTRA-K 4680 MG/15ML DRANK

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C).

Gebruik Ultra-K niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP.". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA NV Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Ultra-K 4680 mg/15 ml drank
Roundup var._IB_C.l.z._readability test ID124706	Pagina 4 van 4

Welke stoffen zitten er in Ultra-K?

- De werkzame stof in Ultra-K is kaliumgluconaat 4680 mg/15 ml (= 20 mEq K⁺ ionen).
- De andere stoffen in Ultra-K zijn methylparahydroxybenzoesaat, citroenzuur monohydraat, natriumsacharine, synthetisch Cherry Brandy aroma, cochenille rood, gezuiverd water voor 15 ml drank.

Hoe ziet Ultra-K eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Ultra-K is een geneesmiddel onder de vorm van een drank, verpakt in een fles met 200 ml of 1000 ml oplossing.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Melisana nv
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel

Fabrikant

Sanico nv
Industriezone 4
Veedijk 59
B-2300 Turnhout

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE071513

Deze bijsluiter is goedgekeurd op: 03/2012