

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Vidisic 2 mg/g ooggel
Vidisic EDO 2 mg/g ooggel
Carbomeer 980

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

VIDISIC/VIDISIC EDO bevat een actief bestanddeel: carbomeer. Dit geneesmiddel is een gel voor de ogen die wordt gebruikt om droge ogen te behandelen, veroorzaakt door een verminderde traanproductie, of wanneer de oogleden niet volledig kunnen gesloten worden. Dit geneesmiddel wordt ook een 'kunsttraan' genoemd.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, zoals het bewaarmiddel cetrimide. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Stop de behandeling en raadpleeg een oogarts als de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert.

Als u contactlenzen draagt

Draag tijdens de behandeling enkel contactlenzen na overleg met uw oogarts. Verwijder uw contactlenzen voor het toedienen van VIDISIC/VIDISIC EDO en wacht tenminste 15 minuten voor het terugplaatsen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast VIDISIC/VIDISIC EDO nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties bekend. Maar indien u gelijktijdig met VIDISIC/VIDISIC EDO andere oogdruppels gebruikt, moet u 15 minuten wachten tussen elke indruppeling. Gebruik Vidisic/Vidisic EDO bij voorkeur als laatste om zo een verminderde werking van het eerst toegediende geneesmiddel te vermijden, en om ervoor te zorgen dat VIDISIC/VIDISIC EDO lang in het oog aanwezig blijft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:

VIDISIC/VIDISIC EDO **mogen** in overeenstemming met het voorschrift gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Als u na het aanbrengen van deze gel last hebt aan de ogen of als uw zicht troebel is, mag u niet rijden of een machine bedienen tot het einde van de symptomen.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

1 druppel in elk oog, 2 tot 3 keer per dag, of volgens advies van de arts

Toedieningswijze



Dit geneesmiddel wordt toegediend in het oog.

Instructies bij het toedienen:

1. was grondig de handen.
2. kijk naar boven, en trek lichtjes het onderste ooglid naar beneden.
3. laat een druppel gel vallen in de ruimte die zo wordt gevormd.
4. raak het oog niet aan met het uiteinde van de tube of de unidose.
5. sluit de tube terug na gebruik, maar gooi de verpakking voor éénmalig gebruik onmiddellijk weg.

VIDISIC EDO bevat geen bewaarmiddel. Geopende verpakkingen voor éénmalig gebruik mogen niet bewaard worden, ze moeten na gebruik onmiddellijk weggegooid worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van VIDISIC/VIDISIC EDO heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (☎ 070/245.245).

Schadelijke effecten na een lokale toediening werden niet waargenomen. Zelfs een accidentele inname van de volledige inhoud van een tube geeft geen aanleiding tot toxicologische gevolgen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Dien de vergeten dosis zo snel mogelijk toe.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Oogaandoeningen:

- een tijdelijke gezichtsstoornis na het indruppelen (tengevolge van de consistentie van de gel).
- branderig gevoel en lokale irritatie na het indruppelen.
- allergische reactie.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik een Vidisic tube niet langer dan 1 maand na de eerste opening.

Werp een geopende Vidisic EDO verpakking voor éénmalig gebruik onmiddellijk na gebruik weg.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Exp:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof is carbomeer 980: 2 mg per g gel.
- De andere stoffen in VIDISIC zijn cetrimide, sorbitol, natriumhydroxide, water voor injectie.
- De andere stoffen in VIDISIC EDO zijn sorbitol, natriumhydroxide, water voor injectie.

Hoe ziet dit middel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Kleurloze, transparante gel.

Vidisic: tube van 10g

Vidisic EDO: doos met 30, 60 en 120 verpakkingen voor éénmalig gebruik van 0,6ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bausch & Lomb Pharma nv

Lambermontlaan 430

1030 Brussel

Fabrikant

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165 – 173

13581 Berlijn

Duitsland

Registratienummers

Vidisic: BE145196

Vidisic EDO: BE230045

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 12/2011.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2012