

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Duofilm, 15 ml, oplossing voor cutaan gebruik

Salicylzuur

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Duofilm en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. WAT IS DUOFILM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?**

Duofilm is een middel tegen wratten, voor het behandelen van gewone wratten van de hand en de voetzool.

#### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- als u overgevoelig (allergisch) bent voor salicylzuur of voor één van de andere bestanddelen van Duofilm.
- als u niet helemaal zeker bent dat het een wrat is, moet U uw dokter raadplegen.
- als u wratten hebt in het aangezicht en op de genitaliën.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- vermijd aanraking met de ogen en de slijmvliezen. De niet-aangedane huidgedeelten rond de wrat vermijden.
- als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

##### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Onverenigbaar met zinkoxide.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

##### **Zwangerschap en borstvoeding**

Duofilm mag gedurende de zwangerschap en gedurende de borstvoeding gebruikt worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

### **3. HOE WORDT DUOFILM GEBRUIKT?**

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

De te behandelen plaats zorgvuldig inzepen, afspoelen en afdrogen.

- Met behulp van het penseel enkele druppels van de vloeistof rechtstreeks op de wrat aanbrengen. Vermijd aanraking met niet-aangedane huidgedeelten.
- Laten drogen en de wrat gedurende ongeveer 12 uur met de vloeistof in contact houden.
- Indien u het product 's morgens aanbrengt, dient u de behandelde plaats door middel van een hechtpleister te beschermen.
- De behandeling dagelijks herhalen gedurende ongeveer 6 tot 12 weken, bij voorkeur 's avonds.
- De regelmatigheid en de volharding zijn onontbeerlijk voor het resultaat. Bij voortijdig stopzetten van de behandeling kunnen de symptomen terugkeren.
- Teneinde het ruwe bovenste laagje van de wrat te verwijderen, wrijft men om de 2 tot 3 dagen, alvorens het product aan te brengen, over de wrat met behulp van een kartonnen vijltje of een puimsteen. Indien een bloeding optreedt, dient de behandeling gedurende ongeveer 3 dagen te worden gestaakt.
- Het is normaal dat de wrat een witachtig aspect neemt.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Een ernstige algemene intoxicatie is enkel te vrezen bij toepassing van Duofilm op een beschadigde huid of op een grote lichaamsoppervlakte en bij ingestie van een zware dosis.

De verschijnselen omvatten spijsverteringsstoornissen en koorts.

Wanneer u te veel van Duofilm heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

In afwachting is het aan te raden de geïntoxiceerde persoon te doen braken en haar geactiveerde kool toe te dienen.

De acute intoxicatieverschijnselen veroorzaakt door Duofilm worden bijzonder slecht verdragen door bejaarden en kleine kinderen. Zij vereisen een behandeling in een ziekenhuis.

### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Duofilm bijwerkingen hebben.

Bij aanraking met de niet-aangedane huidgedeelten, kunnen irritatieverschijnselen optreden die soms gepaard gaan met een branderig gevoel en korstvorming. In dergelijk geval dient u de behandeling te staken en uw dokter te raadplegen. Allergische reacties, namelijk met salicylzuur kunnen eveneens voorkomen.

Er bestaat een risico op salicylisme, een milde chronische salicylaat intoxicatie. Symptomen zijn: duizeligheid, oorsuizen, doofheid, zweten, misselijkheid en braken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

### **5. HOE BEWAART U DUOFILM?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Warmtebronnen of vlammen vermijden.

Na gebruik de fles goed sluiten.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “EXP” op het etiket/buitenverpakking/fles. De vervaldatum is de laatste dag van de vermelde maand.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof is salicylzuur
- De andere stoffen in dit middel zijn melkzuur en soepel collodion

### **Hoe ziet Duofilm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Oplossing voor cutaan gebruiken – Flesje van 15 ml.

### **Afleveringswijze**

Vrije aflevering.

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE128782

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park,

Sligo,

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker of met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor in de handel brengen:  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v., Tél/Tel : +32 (0) 10 85 86 00

A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in (maand/jaar) 07/2012

B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 04/2013