

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Golaseptine-Lidocaine 5 mg-1 mg Zuigtabletten

Chloorhexidine hydrochloride 5 mg - Lidocaïne hydrochloride 1 mg

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel is aangewezen

- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie.
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig.
- Indien er na 3 à 4 dagen geen verbetering optreedt, moet men een arts raadplegen.
- Golaseptine-Lidocaine bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloorhexidine hydrochloride (antisepticum) of lidocaïne hydrochloride (lokaal anestheticum) of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel.
- Kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Dat u het niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Want bij gebruik van een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex en inademingevaar van voedsel in de luchtwegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

- Niet gelijktijdig gebruiken met cholinesterase-remmers.
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Golaseptine-Lidocaine gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat **sorbitol**. Als uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat **menthol**: wees voorzichtig bij jonge kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Volg strikt deze instructies, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker

Dosering

Volwassenen: 6 tot 10 tabletten per dag.

Kinderen vanaf 6 jaar: 3 tot 5 tabletten per dag.

Wijze van toediening

De tablet langzaam in de mond opzuigen.

Behandelingsduur

Deze geneesmiddelen mogen niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

- Door toedoen van lidocaïne kan een systemische intoxicatie (toxische dosis voor volwassenen vanaf 0,5 g) optreden, die het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem beïnvloedt - rusteloosheid, geeuwen, zenuwachtigheid, oorsuizingen, nystagmus, spiertremor, stuipen, depressie, ademnood, drukverlies van de hartspier, perifere vaatverwijding, hypotensie, bradycardie, verstoord hartritme, hartstilstand.
- Want bij gebruik van een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Werd bij vergissing of door onvoorzichtigheid toch een overdosis ingenomen, roep dan een arts of het antigifcentrum (070/245.245) op, of ga naar de spoedgevallendienst van een ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Golaseptine-Lidocaine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Dit geneesmiddel is meestal goed verdragen indien correct gebruikt.
- Zeer zelden kunnen allergische huid (jeuken, rash, dermatitis, urticaria) - en slijmvliesreacties voorkomen.
- Er kunnen smaakstoornissen, branderig gevoel aan de tong en anafylactische reacties optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en warmte.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn: Chloorhexidine HCl 5 mg - Lidocaïne HCl 1 mg
- De andere stoffen in dit middel zijn: sorbitol, magnesiumstearaat, pepermunt.

Hoe ziet Golaseptine-Lidocaine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Doos met 10, 20, 30 en 40 zuigtabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoires SMB NV

Herdersliedstraat 26-28

1080 Brussel, België

Tel: +32 2 411 48 28 - Fax: +32 2 411 28 28 - e-mail: mailcontact@smb.be

Fabrikant:

SMB Technology S.A.,

39 rue du Parc Industriel,

B-6900 Marche-en-Famenne, België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE387344

Afleveringswijze:

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 03/2011.